

# Pasożyty koni

## Czy wiesz, że...?

Konie mogą zarazić się szeroką gamą pasożytów żołądkowo - jelitowych.

Dotyczy to także zwierząt trzymanych w pomieszczeniach bez dostępu do trawy.

**Badanie parazytologiczne w naszym laboratorium pozwoli określić w kale obecność jaj m.in. takich pasożytów jak:**

### **Glista końska**

Badania wykazują odsetek zachorowań na poziomie 20% - 80% u źrebiąt. Często nie obserwuje się objawów klinicznych. Dorosłe klacze mogą wydalać jaja, będąc źródłem inwazji dla kolejnych pokoleń koni.



### **Słupkowce duże**



Najważniejsze pasożyty koni, stanowiące dla nich największe zagrożenie.

Należą tu *Strongylus vulgaris*, *S. edentatus* i *S. equinus*.

Powodują poważne zmiany patologiczne, które różnią się w zależności od gatunku *Strongylus*.

### **Węgorek**

Zarażenia występują głównie u źrebiąt w wieku do sześciu miesięcy. Inwazja może nastąpić w wyniku spożycia larw w mleku klaczy. Jest to podstawowy sposób zarażania się źrebiąt



**Pamiętaj!** Właściwa diagnostyka jest podstawą skutecznego leczenia.

**BADANIA WYKONUJE**

**LABORATORIUM**

**ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ**

**W SZCZECINIE**

ul. Ostrawicka 2, 71-337 Szczecin

[www.ebadania.eu](http://www.ebadania.eu) lub

[www.bip.wiw.szczecin.pl](http://www.bip.wiw.szczecin.pl)

**PRACOWNIA PATOLOGII**

tel.: (091) 48 98 239



ZESKANUJ KOD I  
ODWIEDŹ NASZĄ  
STRONĘ INTERNETOWĄ